

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 17-11-66 577567

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

ABONNEMENT ANNUEL
N° 74 - NOVEMBRE 1966
1966/44

(Tél. 72-58-72)

(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 16, rue de la République - MONTPELLIER

C. C. P. : MONTPELLIER 5.238-57

TRAITEMENTS D'AUTOMNE DES ARBRES FRUITIERS

ARBRES FRUITIERS A NOYAU -

La chute des feuilles s'achève. Sur abricotier, cerisier, pêcher, prunier, il est nécessaire de réaliser un traitement cuprique.

Sur abricotier, ce traitement sera précédé d'un émondage soigné pour éliminer les fruits momifiés, les brindilles et rameaux tués par le Monilia.

Sur cerisier, le traitement d'automne préviendra les maladies bactériennes et ^{attaques} Corynaum; il cicatrisera les multiples plaies créées par la chute des feuilles. Il convient d'effectuer ce traitement en 2 fois (1 à moitié chute des feuilles, 2 après la chute totale des feuilles).

Sur pêcher la pulvérisation automnale d'une bouillie cuprique prévient le Coryneum: d'autre part la réserve de cuivre est susceptible d'assurer une relative protection contre la Cloque.

ARBRES FRUITIERS A PEPINS -

Pommier (chancres) : Certains champignons parasites du pommier pénètrent dans le végétal, à l'automne par diverses blessures (cicatrices foliaires notamment).

C'est le cas du Chancre européen du pommier (Nectria ditissima).

C'est pourquoi il est nécessaire d'effectuer dès maintenant un traitement fongicide soigné, dès la chute des feuilles. On utilisera une bouillie cuprique à raison de 500 g de cuivre métal par hectolitre d'eau (bouillie bordelaise à 2 % par exemple).

Poirier (Maladies bactériennes) : Les maladies bactériennes du poirier prennent un développement important dans certains secteurs de la Circonscription. La maladie se manifeste au débourrement par le noircissement et le dessèchement des boutons floraux. Ensuite on assiste au dégarnissement de rameaux, dessèchement des pousses latérales. Enfin, en cas de fortes précipitations printanières, des taches noires apparaissent sur les feuilles et les poirettes.

Actuellement (chute des feuilles) il est vivement recommandé de pulvériser une solution cuivrique (bouillie bordelaise de 1 à 2% par exemple) dans les plantations où ces symptômes sont apparus.

Pour combattre les Maladies bactériennes utiliser de préférence le cuivre sous forme de sulfate.

ABONNEMENTS 1967

Nous demandons à nos fidèles abonnés de renouveler au plus tôt leur abonnement :

Abonnement ordinaire : 25 frs.

P231

Les Contrôleurs,

L.L. TROUILLON

M. BEZUT

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE